

분류번호 : 331  
전문 의약품



# 비브라운0.9%생리식염주 사액(염화나트륨)

B. Braun 0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

▶원료약품 및 그 분량  
이 약 100mL 중 유효성분  
염화나트륨(BP)-----0.9g  
첨가제  
용제:주사용수(BP)-----적량

▶성상  
폴리에틸렌 용기에 충전된 무색의 수액용 주사제

▶효능·효과  
1. 수분 및 전해질 결핍시의 보급(나트륨 결핍, 염소 결핍)  
2. 주사제의 용해 희석제

▶용법·용량  
염화나트륨으로서 보통 20-1000mL를 피하, 정맥, 점적  
정맥주사 또는 직장에 주입한다.  
투여량, 투여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히  
증감한다.  
주사제의 용해 희석에는 적정량을 사용한다.

▶사용상의 주의사항  
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.  
1) 고나트륨혈증 환자  
2) 수분과다상태 환자  
3) 부종과 복수를 동반한 간경화 환자  
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.  
1) 심장·순환기계기능장애 환자  
2) 신장장애 환자  
3) 저단백혈증 환자  
4) 저나트륨혈증(120mmol/L 미만) 환자  
5) 저칼륨혈증 환자  
6) 고염소혈증 환자  
7) 말초 또는 폐부종 환자  
8) 자간전증 환자  
9) 알도스테론증 또는 나트륨 배설과 관련된 상태나  
치료(코르티코스테로이드 또는 코르티코트로핀)  
중인 환자  
10) 소아 및 고령자

3. 이상반응  
1) 대량·급속투여에 의해 울혈성심부전, 부종, 산증,  
혈청전해질 이상이 나타날 수 있다.  
2) 투여기술과 관련하여 발열, 주사부위의 감염, 국소통증  
또는 반응, 정맥자극, 주사부위로부터 이르는 정맥혈전증  
또는 정맥염, 혈관박출, 과다혈량이 나타날 수 있다.  
3) 이상반응이 나타나면 투여의 중단, 환자의 평가, 적절한  
처치를 실시하고 필요하다면 검사를 위해 잔여액을  
납려준다.

4. 일반적 주의  
지속되는 비경구 치료동안 또는 환자 평가의 근거로 임상적  
평가와 주기적인 실험실적 평가는 체액평형, 전해질농도,  
산염기 평형의 변화를 모니터링하는데 필요하다.

5. 임부, 수유부, 가임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자에  
대한 투여  
고령자는 일반적으로 생리기능이 저하되어 있으므로  
투여속도를 천천히 하고 감량하는 등 주의한다.

6. 적용상의 주의  
1) 조제시 : 주사제의 용해·희석액으로서 사용하는 경우에  
적합성을 확인한다.  
2) 투여전  
(1) 실질적인 색변화, 침전물, 복합적인 불용해, 결정형성  
여부를 검사한다.  
(2) 투여전에 감염에 대한 처치를 한다(환자의 피부나  
기구 소독).  
(3) 한행기에는 체온정도로 따뜻하게 하여 사용한다.  
(4) 개봉 또는 다른 약의 첨가후 즉시 사용하고, 잔액은  
사용하지 않는다.  
3) 투여시 : 천천히 주입한다.

▶저장방법  
밀봉용기, 실온보관

▶포장단위  
제조원 포장단위

▶사용기간 : 제조일로부터 36개월

본제품은 소비자 피해보상 규정에 의거 교환 및 보상 받을  
수 있습니다.

허가(신고)사항 확인 : <http://drug.mfds.go.kr>

작성년월일 : 2017.10.25



판매원 : (주)중근당  
서울 특별시 서대문구  
충정로 8 중근당빌딩  
소비자상담실 : 080-6776-080  
수입원 : 비브라운코리아(주)  
서울 강남구 테헤란로  
440 포스코센터 서관  
13층 TEL : (02)3459-7800  
제조원 : B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd.  
Bayan Lepas Free Industrial Zone,  
11900 Bayan Lepas,  
Penang, Malaysia  
Made in Malaysia

