

분류번호 : 331  
전문의약품



6/15242305/1117



## 비브라운5%포도당생 리식염주사액

B. Braun 5% Glucose and 0.9% Sodium Chloride  
Intravenous Infusion B.P.

### ▶ 원료약품 및 그 분량

이 약 100mL 중 유효성분  
포도당일수화물(BP)-----5.5g  
염화나트륨(BP)-----0.9g

### 첨가제

용제 : 주사용수(BP) ----- 적량

### ▶ 성상

폴리에틸렌 용기에 충전된 무색의 수액용 주사제

### ▶ 효능, 효과

1. 탈수증, 수술전후 등의 수분·전해질 보급
2. 에너지 보급

### ▶ 용법용량

보통 성인 1일 500~1,000mL를 2~3회 나누어 점적 정맥주사한다.

두여속도는 시간당 250~500mL(분당 60~120방울)이고, 영유아의 경우 시간당 15~60mL(분당 4~15방울), 고령자 경우 시간당 250mL(분당 60방울)로 한다.

두여량, 두여속도는 연령, 체중, 증상에 따라 적절히 증감한다.

### ▶ 사용상의 주의사항

#### 1. 경고

포도당 함유제제를 정맥주사하는 환자는 치아민(비타민 B<sub>1</sub>) 소모율이 높기 때문에 순간적으로 치명적인 치아민 결핍을 초래할 가능성이 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 수분과 다상태 환자
- 2) 저장성 탈수증 환자
- 3) 저칼륨혈증 환자
- 4) 고나트륨혈증 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 신질환에서 기인한 신부전 환자
- 2) 심부전 환자
- 3) 고장성 탈수증 환자
- 4) 폐쇄성 요로질환에 의한 요량감소가 있는 환자
- 5) 당뇨병 환자
- 6) 고암소혈증 환자
- 7) 저나트륨혈증(120 mmol/L 미만) 환자

4. 이상반응

- 1) 대량·급속투여에 의해 뇌부종, 폐부종, 말초부종, 산증, 수증 등이 나타날 수 있다.
- 2) 신생아, 미숙아에 급속투여(시간당 100mL 이상)하는 경우 수증 등이 나타날 수 있다.
- 3) 주입정맥에서 혈전증이 나타날 수 있다.

### 5. 일반적 주의

혈당, 혈청 전해질, 체액 평형을 정기적으로 모니터링해야 한다.

### 6. 일부, 수유부, 가임여성, 신생아, 유아, 소아, 고령자에 대한 투여

- 1) 유아 및 고령자에게는 급속 또는 장시간 투여에서는 안된다.
- 2) 고령자에 투여시 특히 중증 실부전 및 신부전 환자에게는 순환과부하를 피하기 위해 주의하여 투여하여야 한다.

### 7. 과량투여시의 처치

이뇨제를 투여하여야 한다.

### 8. 적용상의 주의

#### 1) 투여전

- (1) 투여전에 갑염에 대한 처치를 한다(환자의 피부나 기구 소독).
- (2) 한랭기에는 체온정도로 따뜻하게 하여 사용한다.
- (3) 개봉 후 즉시 사용하고, 잔액은 사용하지 않는다.

#### 2) 투여시

천천히 정맥주사한다.

### 9. 보관 및 취급상의 주의사항

실온에서 보관한다.

### ▶ 저장방법

밀봉용기, 실온보관

### ▶ 포장단위

제조원의 포장단위

사용기간 : 제조일로부터 36개월

본제품은 소비자 피해보상 규정에 의거 교환 및 보상 받을 수 있습니다.

허가(신고)사항 확인 : <http://drug.mfds.go.kr>

작성년월일 : 2017.10.26

판매원 : (주)종근당  
서울특별시 서대문구  
충정로 8 종근당빌딩

소비자상담실 : 080-6776-080

수입원 : 비브라운코리아(주)

서울 강남구 테헤란로

440 포스코센터 서관

13층 TEL : (02)3459-7900

B. Braun Medical Industries

Sdn. Bhd.

Bayan Lepas Free Industrial

Zone, 11900 Bayan Lepas,

Penang, Malaysia

Made in Malaysia



**B | BRAUN**

